



Lidil Spray

Oximetazolina

VENTA LIBRE
Industria Argentina

Spray nasal

Lea detenidamente esta información antes de tomar el medicamento.

¿Qué contiene Lidil Spray?

Cada 100 ml contiene como ingrediente activo: Clorhidrato de oximetazolina 50 miligramos. Ingredientes inactivos: Cloruro de benzalconio; Fosfato de sodio monobásico anhidro; Fosfato de sodio dibásico dodecahidratado; Solución de hidróxido de sodio 0,1 N; Agua purificada c.s.

Acción:

Descongestivo nasal.

¿Para qué se usa Lidil Spray?

Lea detenidamente esta información.

Lidil Spray está indicado para el alivio temporario de la congestión nasal, producida por el resfrío común y estados alérgicos, en niños mayores de 12 años y adultos, con un inicio de acción rápido y una duración de hasta 12 horas.

¿Qué personas no pueden recibir Lidil Spray?

No use este medicamento si Usted tiene:

- Alergia conocida a la Oximetazolina, o a alguno de los ingredientes de este medicamento.
- Aumento de la presión ocular (glaucoma de ángulo cerrado).
- Retención de orina por problemas en la próstata por el aumento del tamaño de la misma (hiperplasia de próstata).
- Si Ud. está siendo tratado con algún medicamento inhibidor de la monoaminooxidasa

(IMAO), como ser medicamentos antidepresivos o para tratar la enfermedad de Parkinson.

- No administrar en niños menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de administrar este medicamento?

Consulte a su médico antes de administrar Lidil Spray.

- No utilizar de manera prolongada dado el riesgo de causar obstrucción nasal (nariz tapada, por efecto rebote).
- No exceder la dosis recomendada.
- Se recomienda administrar con precaución en pacientes de edad avanzada, con hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes o hipertiroidismo.
- No debe utilizarse este medicamento por más de 7 días. Si el cuadro empeora o no mejora después de 7 días de su uso, consulte a su médico.
- Este medicamento no debe ser utilizado por personas que estén tomando o hayan tomado, durante las dos últimas semanas:
 - Medicamentos utilizados para tratar la depresión, tales como, antidepresivos tricíclicos, maprotilina o inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
 - Medicamento para disminuir la presión arterial, como la metildopa.
 - Fenotiazina, medicamento utilizado como tranquilizante.
 - Medicamentos para tratar el asma.
- Embarazo y lactancia: Si está embarazada consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Se recomienda no utilizar este producto durante la lactancia.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

El uso de este producto por más de una persona, puede diseminar una infección.

El efecto de **Lidil Spray** comienza dentro de los 2 minutos y dura hasta 12 horas.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando este medicamento?

Durante el tratamiento con **Lidil Spray** pueden aparecer los siguientes efectos no deseados, tales como:

- Sensación de sequedad nasal.
- Ardor y picazón nasal, estornudos, aumento de la secreción nasal.
- En caso de aplicación de dosis excesivas o durante períodos prolongados, se pueden observar:
 - Dolor de cabeza.
 - Insomnio.
 - Palpitaciones.
- Con el uso prolongado se ha observado atrofia de la mucosa nasal y/o lesión del epitelio mucoso nasal con alteración de la actividad ciliar.
- Con el uso en altas dosis o en forma prolongada, puede afectarse la capacidad para conducir vehículos y/o maquinarias peligrosas.
- En casos de sobredosis, y especialmente en niños, puede provocar depresión del sistema nervioso central.



¿Cómo se usa este medicamento?

Lea detenidamente esta información.

Posología y forma de administración:

Dosis: Para adultos y niños mayores de 12 años la dosificación sugerida es la siguiente:

- Efectuar 1 pulsación de **Lidil Spray** en cada fosa nasal, 1 ó 2 veces por día.


NOTA: Cada pulsación contiene 50 mcg de Clorhidrato de oximetazolina.

Forma de administración:

NOTA: La primera vez que utilice el envase, remueva la tapa del aplicador, coloque su dedo índice y anular sobre las aletas del mismo, el pulgar en el fondo del envase, y accione el aplicador nasal (2 a 3 veces) hasta observar un spray fino, de esta manera la bomba dosificadora quedará lista para su uso.

1. Limpie bien su nariz de secreciones.
2. Agite el envase suavemente, y remueva la tapa del aplicador.
3. Tape una fosa nasal con su dedo pulgar, e introduzca el aplicador en la otra.
4. Inspire a la vez que acciona el aplicador, presionando sus dedos índice y mayor sobre las aletas del mismo, y el pulgar en el fondo del envase.
5. Espire, y repita esta operación en la otra fosa nasal.
6. Limpie el aplicador con un pañuelo descartable y tape el mismo.

La administración a los niños debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.



Limpieza del aplicador:

Al menos una vez por semana remueva el aplicador del frasco, tirando del mismo suavemente hacia arriba, lávelo con agua tibia, déjelo secar en lugar cálido (evitando el exceso de calor), y colóquelo nuevamente en el frasco junto a su tapa.

Si el orificio del aplicador se llegara a tapar, no lo destape con una aguja u otro elemento punzante, retírelo del frasco y déjelo sumergido en agua tibia por unos minutos. Luego colóquelo bajo un chorro de agua tibia, déjelo secar y colóquelo nuevamente en el frasco junto a su tapa.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si administré una cantidad mayor a la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con uno de los siguientes Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

¿Tiene usted alguna pregunta?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0-800-333-5658

O, en caso necesario, al teléfono de **ANMAT responde:**

0-800-333-1234

Presentación:

Lidil Spray Spray nasal: Envase conteniendo 10 ml.

IMPORTANTE:

No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N°: 27.971.

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica.

Elaborado en Álvaro Barros 1113, B1838CMC

Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Octubre de 2024.

Información a profesionales y usuarios:

0-800-333-5658

ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray Justo Sarmiento 2350

B1636AKJ Olivos,

Pcia. de Buenos Aires.

www.roemmers.com.ar

B 1117509870
14914 1124
125 / L639



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA