

Laragón 150

Silimarina

Vía oral

Comprimidos recubiertos

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene Silimarina 150 mg. Excipientes: Lactosa; Celulosa microcristalina; Polivinilpirrolidona K25; Almidón de maíz; Almidón glicolato sódico; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Triacetina; Dióxido de titanio; Sacarina ácida; Amarillo ocazo laca aluminica; Amarillo de quinolina laca aluminica.

Acción terapéutica

Hepatoprotector. Activador de los mecanismos de regeneración hepática.

Indicaciones

Laragón 150 está destinado al tratamiento de las afecciones hepáticas inflamatorias y tóxicas.

Acción farmacológica

La Silimarina es un derivado del fruto del *Silybum marianum*. En los estudios realizados en animales la Silimarina ejerce una actividad antagonista contra una cantidad de toxinas que afectan el hígado (por ej.: La faloidina, la alfa-amanitina, las lantanidinas, el tetracloruro de carbono, la galactosamina, la tioacetamida, el alcohol etílico, etc) y también contra el virus hepatotóxico de los animales poiquiloterms FV_3 . Se ha postulado para la Silimarina un triple mecanismo de acción:

a) Modificación de la membrana celular externa de los hepatocitos impidiendo el ingreso de las toxinas al interior de las células; b) Estimulación de la actividad de la polimerasa A nucleolar, aumentando la síntesis ribosomal de proteínas y la capacidad de regeneración del hígado y la formación de nuevos hepatocitos y c) Un efecto antioxidante que contrarresta la acción de los radicales libres que se forman como metabolitos reactivos por acción de las toxinas y que dañan las membranas celulares.

Farmacocinética:

Luego de la administración oral de Silimarina sólo se detectan bajas concentraciones plasmáticas de su elemento constitutivo principal, la silibinina. La concentración plasmática máxima se obtiene en alrededor de 2 horas. Sólo alrededor del 1% de la dosis administrada se recupera en la orina en las 24 horas posteriores a la administración. Por el contrario, en la bilis se recupera un porcentaje relativamente elevado (20 a 40%) de silibinina en forma libre o conjugada. La vida media de eliminación biliar es alrededor de 4 horas y se estima que el tiempo de permanencia de la sustancia en el organismo se eleva a alrededor de 8 horas. La eliminación biliar de la silibinina es principalmente bajo la forma de sulfato o glucurónido y en pequeña proporción sin cambios. No se han aislado otros metabolitos en concentraciones apreciables.

Posología y forma de administración

Dosis inicial habitual y casos graves: 1 comprimido recubierto, 3 veces por día, durante las comidas.

Tratamiento de mantenimiento y casos menos severos: 1 comprimido recubierto, 2 veces por día, durante las comidas.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a la Silimarina.

Precauciones y advertencias

No se han descrito hasta el momento.

Embarazo: Los estudios toxicológicos preclínicos no han evidenciado efectos teratogénicos, pero no existe experiencia en mujeres embarazadas. Lactancia: No se dispone de datos acerca de la posible aparición del medicamento en la leche materna.

Interacciones medicamentosas

No se han descrito hasta el momento.





Reacciones adversas

Laragón 150 es generalmente bien tolerado. En casos aislados se ha informado epigastralgia, aceleración del tránsito intestinal y, excepcionalmente, reacciones de hipersensibilidad.

Sobredosificación

No se conocen las manifestaciones clínicas de la sobredosis de Silimarina. Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Evacuación gástrica, administración de carbón activado. Control clínico y tratamiento sintomático. No se han descripto antidotos específicos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación

Laragón 150 Comprimidos recubiertos: Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos.



Comprimidos cilíndricos, color anaranjado claro, codificados LG 150 en una cara y con isotipo de identificación Roemmers en la otra.

Venta bajo receta.

Industria Argentina.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 33.914.

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Diciembre de 2000.

Producto medicinal.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Información a profesionales y usuarios: ☎ 0-800-333-5658

Roemmers S.A.I.C.F.

Fray Justo Sarmiento 2350,

B1636AKJ Olivos,

Pcia. de Buenos Aires

www.roemmers.com.ar

B 1123901845
11430 0514



28



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

