

Sertal

Comprimidos

Propinox

Alivia dolores y malestares digestivos

Antiespasmódico

Comprimidos recubiertos · *Vía oral*

VENTA LIBRE
Industria Argentina

¿Qué contiene Sertal Comprimidos?

Cada comprimido recubierto contiene:

Ingrediente Activo: Propinox clorhidrato 10,000 miligramos.

Ingredientes Inactivos o Excipientes: Almidón de maíz; Talco; Ácido silícico coloidal; Celulosa microcristalina; Lactosa anhidra; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Triacetina; Dióxido de titanio; Carmin de cochinilla; Rojo allura (laca aluminica); Polietilenglicol 6000.

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.

Acción:

Calma los espasmos (Antiespasmódico) y el dolor de tipo cólico.

¿Para qué se usa Sertal Comprimidos?

Lea detenidamente esta información.

Sertal Comprimidos está indicado para el alivio de los dolores y malestares digestivos, producidos por los espasmos del aparato digestivo, las vías biliares y el aparato genitourinario.

¿Qué personas no pueden recibir Sertal Comprimidos?

No use este medicamento si Usted tiene:

Alergia conocida al Propinox. Glaucoma (aumento de la presión del ojo). Retención de orina por enfermedades prostáticas. Estenosis pilórica (estrechamiento del píloro). Ileo paralítico (parálisis intestinal). Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal). Miastenia gravis (enfermedad con debilidad muscular).

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de tomar **Sertal Comprimidos** si sufre de hipertiroidismo (aumento de hormonas tiroideas), insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón (infarto o angina de pecho), estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir a dosis elevadas o en pacientes sensibles:

- Problemas para enfocar la vista y visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
- Sequedad de boca, constipación.
- Palpitaciones o taquicardia.
- Aumentos de la temperatura corporal, hecho a tenerse en cuenta en caso de tener fiebre o en ambientes con temperaturas elevadas.

Más raramente, en pacientes predispuestos puede producir retención urinaria, aumento de la presión del ojo, cansancio, disminución de la memoria.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos. En especial si se encuentra tomando alguno de los siguientes medicamentos: antidepresivos tricíclicos, amantadina, metoclopramida, quinidina (medicamento cardiovascular), agonistas



beta adrenérgicos (medicamentos para el asma) o antihistamínicos (medicamentos antialérgicos), deberá consultar a su médico antes de usar este medicamento.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Cómo usar este medicamento?

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos, hasta 4 veces al día por vía oral.

Los comprimidos deben ser ingeridos enteros sin masticar y con adecuada cantidad de líquido.

Si los síntomas (dolor abdominal de tipo cólico) persisten por más de 48-72 horas o empeoran, suspenda la medicación y consulte a su médico.

Presentación:

Sertal Comprimidos:

Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé una cantidad mayor a la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Podrá comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel. (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Dr. Alejandro Posadas - Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?

Para comunicarse:

Laboratorio Roemmers: Información a profesionales y usuarios
☎ 0-800-333-5658. ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico. Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Fecha de última actualización: Enero de 2021.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 37.396

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

www.roemmers.com.ar

B 1156714843
13926 0521



48