

Sertal

Propinox

Antiespasmódico

Comprimidos recubiertos · Vía oral

VENTA LIBRE
Industria Argentina

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene:

Propinox clorhidrato 10 mg. Excipientes: Almidón de maíz; Talco; Ácido silícico coloidal; Celulosa microcristalina; Lactosa anhidra; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Triacetina; Dióxido de titanio; Carmín de cochinilla; Rojo allura (laca aluminica); Polietilenglicol 6000.

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.

Acción:

Calma los espasmos (Antiespasmódico) y el dolor de tipo cólico.

¿Para qué se usa Sertal?

Lea detenidamente esta información.

Sertal está indicado para el alivio del malestar producido por los espasmos dolorosos del aparato digestivo, las vías biliares y el aparato genitourinario.

¿Qué personas no pueden recibir Sertal?

No use este medicamento si Usted tiene:

Alergia conocida al Propinox. Glaucoma (aumento de la presión del ojo). Retención de orina por enfermedades prostáticas. Estenosis pilórica (estrechamiento del píloro). Ileo paralítico (parálisis intestinal). Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal). Miastenia gravis (enfermedad con debilidad muscular).

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de tomar **Sertal** si sufre de hipertiroidismo (aumento de hormonas tiroideas), insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón (infarto o angina de pecho), estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir a dosis elevadas o en pacientes sensibles:

- problemas para enfocar la vista y visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
- sequedad de boca, constipación.
- palpitaciones o taquicardia.
- aumentos de la temperatura corporal, hecho a tenerse en cuenta en caso de tener fiebre o en ambientes con temperaturas elevadas.

Más raramente, en pacientes predispuestos puede producir retención urinaria, aumento de la presión del ojo, cansancio, disminución de la memoria.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos. En especial si se encuentra tomando alguno de los siguientes medicamentos: antidepresivos tricíclicos, amantadina, metoclopramida, quinidina (medicamento cardiovascular), agonistas beta adrenérgicos (medicamentos para el asma) o antihistamínicos (medicamentos antialérgicos), deberá consultar a su médico antes de usar este medicamento.





Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Cómo usar este medicamento?

Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 comprimidos, hasta 4 veces al día por vía oral.

Los comprimidos deben ser ingeridos enteros sin masticar y con adecuada cantidad de líquido.

Si los síntomas (dolor abdominal de tipo cólico) persisten por más de 48-72 horas o empeoran, suspenda la medicación y consulte a su médico.

Presentación:

Sertal Comprimidos recubiertos 10 mg:

Envase conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé una cantidad mayor a la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Podrá comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel. (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Dr. Alejandro Posadas - Tel. (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel. (0221) 451-5555.

¿Tiene Usted alguna pregunta?

Para comunicarse:

Laboratorio Roemmers: Información a profesionales y usuarios

☎ 0-800-333-5658. ANMAT responde 0800-333-1234.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico. Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Fecha de última actualización: Agosto de 2012.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO N°: 37.396

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

www.roemmers.com.ar

B 1156714841
12792 0717



48



ROEMMERS
CONCIENCIA POR LA VIDA

