



# Sertal *fem*

# Propinox

**Alivia los síntomas menstruales**  
Cápsulas blandas · Vía oral

**VENTA LIBRE**  
Industria Argentina

## ¿Qué contiene Sertal Fem?

Cada cápsula blanda contiene:

Ingrediente activo: Propinox clorhidrato 20 mg.

Ingredientes inactivos: Ácido cítrico anhidro; Glicerina; Agua purificada; Polietilenglicol 600; Gelatina; Sorbitol / Glicerina; Metilparabeno; Propilparabeno; FD&C rojo #40.

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES  
DE TOMAR EL MEDICAMENTO.**

## Acción:

Calma los espasmos (Antiespasmódico) y el dolor de tipo cólico. Alivia los síntomas menstruales.

## ¿Para qué se usa Sertal Fem?

### Lea detenidamente esta información.

**Sertal Fem** está indicado para el alivio de los espasmos dolorosos del aparato digestivo, las vías biliares y los síntomas menstruales.

## ¿Qué personas no pueden recibir Sertal Fem?

### No use este medicamento si Usted tiene:

Alergia conocida al Propinox. Glaucoma (aumento de la presión del ojo).

Retención de orina por enfermedades prostáticas. Estenosis pilórica (estrechamiento del píloro). Íleo paralítico (parálisis intestinal). Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal). Miastenia gravis (enfermedad con debilidad muscular). Mujeres en período de lactancia.

## ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Consulte a su médico antes de tomar **Sertal Fem** si sufre de hipertiroidismo (aumento de hormonas tiroideas), insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón (infarto o angina de pecho), estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

## ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Este medicamento puede producir a dosis elevadas o en pacientes sensibles:

- problemas para enfocar la vista y visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
- sequedad de boca, constipación.
- palpitaciones o taquicardia.
- aumentos de la temperatura corporal, hecho a tenerse en cuenta en caso de tener fiebre o en ambientes con temperaturas elevadas.





Más raramente, en pacientes predispuestos puede producir retención urinaria, aumento de la presión del ojo, cansancio, disminución de la memoria. Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos. En especial si se encuentra tomando alguno de los siguientes medicamentos: Antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, quinidina (medicamento cardiovascular), o antihistamínicos (medicamentos antialérgicos), deberá consultar a su médico antes de usar este medicamento.

**SI USTED ESTÁ TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.**

### ¿Cómo usar este medicamento?

**Adultos y mayores de 10 años:** 1 cápsula blanda, hasta 5 veces al día por vía oral. Las cápsulas blandas deben ser ingeridas enteras sin masticar y con adecuada cantidad de líquido.

Si los síntomas (dolor abdominal de tipo cólico) persisten por más de 48-72 horas o empeoran, suspenda la medicación y consulte a su médico.

### Presentación

**Sertal Fem** Cápsulas blandas: Envases conteniendo 6 y 20 cápsulas blandas. Cápsulas blandas, esféricas, transparentes, de color rosa.

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé una cantidad mayor a la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Podrá comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez**

Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

**Hospital Dr. Alejandro Posadas**

Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Centro de Asistencia Toxicológica La Plata**

Tel.: (0221) 451-5555.

### ¿Tiene Usted alguna pregunta?

**Para comunicarse:**

Laboratorio Roemmers: Información a profesionales y usuarios

☎ 0-800-333-5658. ANMAT responde 0800-333-1234

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O A SU FARMACÉUTICO. ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30° C.**

Fecha de última actualización: Junio de 2017.

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD  
CERTIFICADO N°: 33.133**

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica.

Elaborado en Av. Márquez 654 / 91 - B1657CSA - Pcia. de Buenos Aires.

**ROEMMERS S.A.I.C.F.**

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

Información a profesionales y usuarios ☎ 0-800-333-5658.

[www.roemmers.com.ar](http://www.roemmers.com.ar)



B 1156721840  
13453 1018

