

# Sertal

Propinox /  
Clonixinato de lisina

## Compuesto

Comprimidos recubiertos · Vía oral

**VENTA LIBRE**  
Industria Argentina

Lea detenidamente esta información antes de tomar el medicamento.

### ¿QUÉ CONTIENE SERTAL COMPUESTO?

Cada comprimido recubierto contiene como ingrediente activo: Propinox clorhidrato 10 miligramos; Clonixinato de lisina 125 miligramos. Ingredientes inactivos: Manitol; Ácido cítrico anhidro; Almidón pregelatinizado; Celulosa microcristalina; Almidón de maíz; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Dióxido de titanio; Triacetina; Carmin de cochinilla laca aluminica; FD & C rojo #40, laca aluminica; Polietilenglicol 6000.

### ACCIÓN:

Calma los espasmos (antiespasmódico) y el dolor de tipo cólico.

### ¿PARA QUÉ SE USA SERTAL COMPUESTO?

Lea detenidamente esta información.

**Sertal Compuesto** es una asociación de Propinox clorhidrato, un medicamento antiespasmódico y Clonixinato de lisina, un analgésico que pertenece al grupo de los medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroides (AINEs).

**Sertal Compuesto** se utiliza para calmar los espasmos y el dolor, asociados a los dolores menstruales o a espasmos del intestino, en adultos y niños mayores de 12 años de edad.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR SERTAL COMPUESTO?

No use este medicamento si Usted tiene:

- Alergia conocida al Propinox, a Clonixinato de lisina, o a alguno de los ingredientes de este medicamento.
- Úlcera de estómago o de duodeno, algún tipo de hemorragia de estómago o intestino.
- Antecedentes de asma bronquial, pólipos nasales o reacción alérgica, tras la administración de aspirina (ácido acetilsalicílico) u otros antiinflamatorios no esteroides.

- Aumento de la presión ocular (glaucoma).
- Retención de orina por enfermedad de próstata.
- Estrechamiento del píloro (estenosis pilórica).
- Parálisis intestinal (íleo paralítico).
- Inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal (colitis ulcerosa).
- Una enfermedad que cursa con debilidad muscular, denominada Miastenia gravis.
- Embarazo.
- Lactancia.
- Niños menores de 12 años.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico antes de tomar **Sertal Compuesto** si sufre de hipotiroidismo (disminución de las hormonas tiroideas), algún tipo de obstrucción intestinal o dificultad al orinar, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad isquémica del corazón (infarto o angina de pecho), estrechamiento de la válvula mitral, reflujo gastroesofágico, hernia hiatal.

Emplear con precaución en pacientes con antecedentes gastrointestinales, como úlceras de estómago, gastritis o enfermedad inflamatoria del intestino, o con alteración de la función del riñón o del hígado.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si durante el tratamiento con **Sertal Compuesto** aparecen reacciones alérgicas en la piel y/o mucosas, síntomas de úlcera de estómago o duodeno, o hemorragia gastrointestinal, se deberá suspender el tratamiento y consultar con el médico.

Este medicamento puede producir, a dosis elevadas o en pacientes sensibles:

- Problemas para enfocar la vista o visión borrosa, por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
- Aumentos de la temperatura corporal, hecho a tenerse en cuenta en caso de tener fiebre o en ambientes con temperaturas elevadas.

Durante el tratamiento con **Sertal Compuesto** pueden aparecer los siguientes efectos no deseados, como, por ejemplo: Malestar y dolor abdominal, náuseas, vómitos, sequedad de boca, constipación, diarrea, mareos, somnolencia, dolor de cabeza, palpitaciones.

Más raramente se puede observar: Alergia de la piel, gastritis, sangrado gastrointestinal, retención urinaria, aumento de la presión ocular, cansancio, disminución de la memoria.

Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o durante el período de lactancia, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.





## ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información.

Posología y Forma de administración:

Dosis: Para adultos y mayores de 12 años, la dosificación sugerida es la siguiente:

- Uno o dos comprimidos 3 a 4 veces por día, a intervalos regulares.
- No exceder la dosis máxima de 6 comprimidos por día.
- Ingerir los comprimidos enteros, sin masticar y con abundante líquido.

Se recomienda ingerir los comprimidos con las comidas para reducir las posibles molestias de estómago.

Si los síntomas (dolor abdominal de tipo cólico) persisten por más de 48-72 horas o empeoran, suspenda la medicación y consulte a su médico.

## ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ UNA CANTIDAD MAYOR A LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con uno de los siguientes Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247.

## ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0 800 333 5658.

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE:

0800 333 1234.

## PRESENTACIÓN:

**Sertal Compuesto** comprimidos recubiertos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.

CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

CERTIFICADO N°: 35.975.

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica.

Elaborado en José E. Rodo 6424, C1440AKJ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
IMPORTANTE:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Marzo 2023.

Información a profesionales y usuarios ☎ 0-800-333-5658

**ROEMMERS S.A.I.C.F.**

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires

[www.roemmers.com.ar](http://www.roemmers.com.ar)

B 1174508840  
14338 0423



90



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA

