



Mucolitic Antitusivo

Carboximetilcisteína / Dextrometorfano bromhidrato

Vía oral
Jarabe

Fórmula

Cada 100 ml de jarabe contiene Carboximetilcisteína 3 g. Dextrometorfano bromhidrato 100 mg. Excipientes: Metilparabeno; Propilparabeno; Colorante rojo punzó 4R; Azúcar; Hidróxido de sodio para pH 5.0-7.0; Esencia sabor frambuesa; Esencia sabor cereza; Agua destilada.

Acción terapéutica

Antitusivo y mucolítico.

Indicaciones

Fluidificante de la secreción de la mucosa de las vías respiratorias y tratamiento sintomático de la tos no productiva.

Posología - forma de administración

Administrar según criterio médico. En general se recomienda:

Adultos y niños mayores de 10 años: 10 ml cada 6 u 8 horas.

Niños de 6 a 10 años: 5 ml cada 6 u 8 horas.

Niños de 2 a 5 años: 2,5 ml cada 6 u 8 horas.

Niños menores de 2 años: Según criterio médico.

Precauciones y advertencias

La ingesta concurrente de bebidas alcohólicas, drogas, sedantes y dosis elevadas pueden producir somnolencia, sequedad bucal y otros trastornos gastrointestinales.

En casos de insuficiencia hepática, la posología inicial de Dextrometorfano debe reducirse en un 50% y podrá aumentarse eventualmente en función de la tolerancia.

A dosis elevadas (10 veces la usual), el Dextrometorfano puede producir fenómenos de dependencia psíquica.

La Carboximetilcisteína debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y no debe administrarse a pacientes con úlcera activa.

En caso de diabetes tener en cuenta el aporte de azúcar del jarabe.

Antagonismos y antídotos

No posee.

Reacciones adversas

El tratamiento es, en general, bien tolerado. Eventualmente pueden ocurrir: Reacción alérgica a los componentes, erupción cutánea. Náuseas, vómito, diarrea, malestar gástrico, sangrado gastrointestinal, constipación. Dolor de cabeza, vértigo, somnolencia. Broncoespasmo.

Contraindicaciones

Sensibilidad conocida a los componentes. Asma bronquial, tos de asmático. Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. Insuficiencia respiratoria. Tratamiento con IMAO. Úlcera gastroduodenal. Embarazo. Lactancia.

Sobredosificación

En caso de sobredosis puede observarse: Gastralgia, náusea, diarrea, vómito, erupción cutánea, agitación, confusión, somnolencia, depresión respiratoria, nistagmus.

Sobredosis masiva de Dextrometorfano puede causar: Convulsión, depresión respiratoria y coma. Tratamiento: Para depresión respiratoria: Naloxona - Asistencia respiratoria.

En caso de convulsión: Benzodiazepinas.

Evacuación digestiva.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247; Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentación

Mucolitic Antitusivo Jarabe: Envase conteniendo 100 ml.

Líquido transparente, algo viscoso, de color rosa con sabor y olor a frambuesa y cereza.

Este medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Venta bajo receta archivada.

Industria Argentina.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.436.

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica.

Elaborado en Álvaro Barros 1113, B1838CMC - Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Febrero de 1995.

Producto medicinal.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

Información a profesionales y usuarios: ☎ 0-800-333-5658

Roemmers S.A.I.C.F.

Fray Justo Sarmiento 2350, B1636AKJ Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

www.roemmers.com.ar



B 1177701870
14154 0722



75 / L239

