

PARACETAMOL • FENILEFRINA • BUTETAMATO • CAFÉINA

# Decidex Grip

DESCONGESTIVO • ANTIFEBRIL • ANTITUSIVO • ANALGÉSICO

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

## ¿QUÉ CONTIENE DECIDEX GRIP?

Cada comprimido recubierto contiene como **ingredientes activos:** Paracetamol 500 mg; Fenilefrina clorhidrato 8 mg; Butetamato citrato 40 mg; Cafeína 30 mg. **Ingredientes inactivos:** Croscarmelosa sódica; Dióxido de silicio coloidal; Copovidona; Povidona K 30; Polietilenglicol 400; Celulosa microcristalina; Estearato de magnesio; Amarillo ocazo laca aluminica; Azul brillante laca aluminica; Hidroxipropilmetilcelulosa 2910 5 cp; Dióxido de titanio; Triacetina.

## ACCIÓN:

Descongestivo, calma el dolor, baja la fiebre y calma la tos.

## ¿PARA QUÉ SE USA DECIDEX GRIP?

Se utiliza para el tratamiento de los síntomas gripales y resfriados que cursan con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, congestión nasal y conjuntival y decaimiento general.

## ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR DECIDEX GRIP?

NO USE este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes. Si es menor de 16 años. Si la aspirina u otros calmantes del dolor o los antiinflamatorios le producen asma, inflamación nasal, urticaria o reacciones alérgicas severas. Si tiene úlcera gástrica o duodenal activa o antecedentes de úlcera recurrente. No debe ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Emplear con precaución en pacientes con hipertiroidismo, afecciones cardíacas, diabetes, enfermedades de la próstata o hipertensión arterial. Se sugiere emplear con precaución en los que acostumbran a ingerir bebidas alcohólicas. Si Usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. El Paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente y producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte con su médico antes de tomar este medicamento. Si usted toma anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio consulte con su médico antes de ingerir este producto. No ingiera otro producto que contenga Paracetamol conjuntamente con **DECIDEX GRIP**. Si usted está tomando medicamentos para el corazón o la enfermedad de Parkinson consulte a su médico. Si usted está tomando oxitocina, dihidroergotamina, ergometrina, antidepresivos u hormonas tiroideas consulte con su médico antes de ingerir el producto.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda el medicamento y consulte a su médico si se presenta alguna erupción cutánea, insomnio, mareos, trastornos

gastrointestinales, taquicardia, nerviosismo, sedación, sequedad de mucosas, sangrado espontáneo, náuseas, vómitos o malestar gástrico. **No tomar por más de 3 días si el dolor o la fiebre persisten. Consulte a su médico.**

## ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Lea detenidamente esta información. **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Dosis: Para adultos y niños mayores de 16 años la dosificación sugerida es la siguiente:**

- Un comprimido recubierto cada 8 horas, acompañado con un vaso de agua, jugo u otro líquido.
- Dosis máxima: 3 comprimidos recubiertos por día.

**Si los síntomas de dolor o fiebre persisten por más de 48-72 horas, consulte con su médico.**

## ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Concurra al Hospital más cercano o comuníquese con uno de los siguientes Centros de Toxicología:

- **HOSPITAL A. POSADAS:** (011) 4654 6648 ó (011) 4658 7777.
- **HOSPITAL DE PEDIATRÍA R. GUTIÉRREZ:** (011) 4962 6666 ó (011) 4962 2247.

## ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A DECIDEX GRIP?

Comuníquese a la línea gratuita de información a profesionales y usuarios: **0 800 333 5658**. O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: **0800 333 1234**.

VENTA LIBRE  
Industria Argentina

VÍA ORAL | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

## PRESENTACIÓN:

**DECIDEX GRIP** se presenta en envases conteniendo **10 comprimidos recubiertos**.



Comprimidos oblongos, color verde oscuro, ranurados.

**Conservar en lugar seco a una temperatura inferior a 30°C.**

**"Mantener fuera del alcance de los niños".**

**"Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico".**

**"No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase".**

**Elaborado en:** Álvaro Barros 1113, B1838CMC, Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.

**Directora Técnica:** Jorgelina D'Angelo, Farmacéutica.

**Certificado N°:** 58004.

**Fecha de última actualización:** Julio de 2016.

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.**

**INFORMACIÓN A PROFESIONALES Y USUARIOS:**

**0 800 333 5658.**

**ROEMMERS S.A.I.C.F.**

Fray Justo Sarmiento 2350 (B1636AKJ).

Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

**www.roemmers.com.ar.**

  
**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA



B 1191303840  
12570 1016



24 / L110