

# Decidex

## Grip T-Forte

Paracetamol / Fenilefrina HCl / Vitamina C

**VENTA LIBRE**  
Industria Argentina

Polvo para solución oral. Sabor miel y limón. Sin azúcar

**Lea con cuidado esta información antes de utilizar este medicamento.**

**¿Qué contiene Decidex Grip T-Forte?**

Cada sobre de 5 g contiene como ingredientes activos: Paracetamol 650 mg; Fenilefrina clorhidrato 10 mg; Vitamina C 50 mg.

Ingredientes inactivos: Ácido cítrico 240 mg; Sucralosa 35 mg; Esencia de limón 260 mg; Esencia de miel 80 mg; Esencia de té 50 mg; Colorante caramelo 16 mg; Manitol c.s.p 5000 mg.

**Acción:**

Analgésico, antifebril, descongestivo nasal.

**¿Para qué se usa Decidex Grip T-Forte?**

**Lea detenidamente esta información.**

**Decidex Grip T-Forte** está indicado para el alivio sintomático de los estados gripales y/o resfríos, dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal y/o dolor de garganta.

**¿Cómo se usa este medicamento?**

Adultos y mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza de té con agua caliente. Dosis: 1 sobre cada 6 a 8 horas, mientras los síntomas persistan.

No administrar más de 4 sobres en 24 hs.

No administrar en menores de 12 años. No utilizar por más de 5 días seguidos.

**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?**

Este producto debe ser administrado con precaución en pacientes:

- Antecedentes de enfermedad del esófago o estómago, por la posibilidad de gastritis, úlcera gástrica o sangrado gastrointestinal.
- Si está tomando algún otro medicamento, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

- Si consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
- El Paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre, fundamentalmente.
- No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración.
- En ningún caso utilice este producto después de la fecha de vencimiento.
- Si Ud. toma al mismo tiempo: Anticoagulantes, anticonvulsivantes u otro antiinflamatorio, consulte con su médico antes de ingerir este producto.
- No administrar conjuntamente con medicamentos antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
- Si el dolor persistiera por más de 5 (cinco) días, la fiebre por más de 3 (tres) días o se agravan los síntomas, consulte a su médico.

Si Ud. está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?**

No exceder la dosis recomendada de 4 (cuatro) sobres por día, ya que podrían aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como nerviosismo, somnolencia, irritabilidad o excitación, taquicardia o palpitaciones, aumento de la presión arterial, erupciones cutáneas, urticaria o prurito (reacciones de tipo alérgicas), malestares gastrointestinales. Evitar las bebidas alcohólicas.

Si los síntomas por lo que está tomando este medicamento persisten por 48 horas, suspenda la medicación y consulte a su médico.

No tomar esta medicación por más de 5 días seguidos. Si considera que ha sufrido un efecto adverso importante o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico.

### ¿Qué personas no pueden recibir este medicamento?

No use este medicamento:

- Niños menores de 12 años
- Si Ud. sabe que es alérgico a algún componente de la fórmula o presenta antecedentes de asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas al utilizar aspirina u otros antiinflamatorios.
- Si Ud. padece de úlcera gástrica o intestinal o antecedentes de úlcera gástrica.
- En caso de hipertiroidismo, enfermedad hepática, hepatitis de origen viral, trastornos renales o alcoholismo.
- Aumento del tamaño de la próstata, hipertensión arterial.
- Enfermedad de la tiroides.
- Si Ud. padece de glaucoma (presión intraocular) o alguna enfermedad del corazón (aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, dolor de pecho, presión elevada).

### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé una cantidad mayor a la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con uno de los siguientes Centros de Toxicología:

- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Hospital R. Gutierrez: (011) 4962-6666 / 4962-2247

### ¿Tiene alguna pregunta respecto a Decidex Grip T-Forte ?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:  
0-800-333-5658

O, en caso necesario, al teléfono de

**ANMAT responde:**

0-800-333-1234

### Presentación

**Decidex Grip T-Forte** Polvo para solución oral:

Envase conteniendo 10 sobres con 5 gramos de polvo.

### IMPORTANTE:

No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Mantenga el producto en su envase original y conserve el prospecto.

**Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.**

**Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Conservar en lugar seco a temperatura entre 15 y 30°C.**

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acondicionamiento primario y secundario en  
Fray Cayetano Rodríguez 3520, B1702BSN  
Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires.  
Fecha de última actualización: Mayo de 2024.

### Información a profesionales y usuarios:

 **0-800-333-5658**

### ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350,  
B1636AKJ Olivos,  
Pcia. de Buenos Aires.

[www.roemmers.com.ar](http://www.roemmers.com.ar)

Medicamento autorizado por el  
Ministerio de Salud de la Nación.  
Certificado N°: 57.993.  
Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo,  
Farmacéutica.

B 1191304840  
14780 0924



110



**ROEMMERS**  
CONCIENCIA POR LA VIDA